

Espèces d'oiseaux répertoriées au cours des inventaires, Falaise Saint-Jacques, 2007.

Espèce ¹	Code	Statut ²		Période de migration (avril et mai)		Période de nidification (juin)	
		Au Québec	En région	Stations d'écoute ³	Hors-compte ⁴	Stations d'écoute	Hors-compte
Bernache du Canada	BECA	NMc Hi	NM Hi	●			●
Plongeon huard	PLHU	NMc Hi	M E Hx		●		
Cormoran à aigrettes	COAI	NMc Hx	M E hx	●			
Grand Héron	GRHÉ	NMc Hx	NM hi		●	●	
Bihoreau gris	BIGR	NMp hx	NM		●		
Épervier de Cooper	ÉPCO	NMr Hr	NM H	●			
Buse à queue rousse	BUQR	NMc Hr	NM H	●			
Crécerelle d'Amérique	CRAM	NMc Hr	NM H	●			
Pluvier kildir	PLKI	NMc hi	NM hi	●		●	
Goéland à bec cerclé	GOBC	NMc Hi	NM hi	●		●	
Pigeon biset	PIBI	NSc	NS	●		●	
Tourterelle triste	TOTR	NMc Hp	NM H	●			
Martinet ramoneur	MARA	NMp	NM	●		●	
Colibri à gorge rubis	COGR	NMc	NM	●			●
Martin-pêcheur d'Amérique	MPAM	NMc Hi	NM Hx	●			
Pic mineur	PIMI	NRc	NR	●		●	
Pic chevelu	PICH	NRc	NR	●			
Pic flamboyant	PIFL	NMa Hr	NM H	●		●	
Moucherolle des aulnes	MOAU	NMc	NM			●	
Moucherolle tchébec	MOTC	NMc	NM	●			
Moucherolle phébi	MOPH	NMp hx	NM hx		●		
Viréo à tête bleue	VITB	NMc	NM	●			
Viréo mélodieux	VIMÉ	NMp	NM	●		●	
Viréo aux yeux rouges	VIYR	NMa	NM	●		●	
Geai bleu	GEBL	NRa	NR	●			
Corneille d'Amérique	COAM	NMa Hp	NM H	●		●	
Hirondelle bicolore	HIBI	NMa	NM	●			
Hirondelle rustique	HIRU	NMa	NM	●			
Mésange à tête noire	MÉTN	NRa	NR	●		●	
Sittelle à poitrine rousse	SIPR	NRc	NR			●	
Sittelle à poitrine blanche	SIPB	NSc	NS	●			
Grimpereau brun	GRBR	NMp Hr	NM H	●			
Troglodyte familial	TRFA	NMp	NM		●	●	
Roitelet à couronne dorée	ROCD	NMc Hr	NM H	●			

Espèces d'oiseaux répertoriées au cours des inventaires, Falaise Saint-Jacques, 2007.

Espèce ¹	Code	Statut ²		Période de migration (avril et mai)		Période de nidification (juin)	
		Au Québec	En région	Stations d'écoute ²	Hors-compte ³	Stations d'écoute	Hors-compte
Roitelet à couronne rubis	ROCR	NMc Hx	NM Hx	●			
Grive fauve	GRFA	NMa	NM	●		●	
Grive solitaire	GRSO	NMc Hi	NM Hx	●			
Grive des bois	GRBO	NMp	NM	●			
Merle d'Amérique	MEAM	NMa Hr	NM H	●		●	
Moqueur chat	MOCH	NMc hx	NM hx	●		●	
Étourneau sansonnet	ÉTSA	NMa Hp	NM H	●		●	
Jaseur d'Amérique	JAAM	NMa Hi	NM Hi	●		●	
Paruline obscure	PAOB	NMc	MEi		●		
Paruline à joues grises	PAJG	NMc	NM		●		
Paruline jaune	PAJA	NMc	NM	●		●	
Paruline à flancs marron	PAFM	NMc	NM	●			
Paruline noir et blanc	PANB	NMc	NM	●			
Paruline flamboyante	PAFL	NMa	NM	●		●	
Paruline couronnée	PACO	NMc Hx	NM Hx	●			
Paruline triste	PATR	NMc	NM	●			
Paruline masquée	PAMA	NMa	NM		●	●	
Tangara écarlate	TAÉC	NMp	NM		●		
Bruant hudsonien	BRHU	NMc Hp	M H		●		
Bruant familier	BRFA	NMa Hi	NM Hx	●			
Bruant chanteur	BRCH	NMa Hr	NM H	●		●	
Bruant à gorge blanche	BRGB	NMa Hr	NM H	●			
Junco ardoisé	JUAR	NMa Hr	NM H	●			
Cardinal rouge	CARO	NSp	NS	●		●	
Passerin indigo	PAIN	NMp	NM			●	
Carouge à épaulettes	CAÉP	NMa Hr	NM H	●		●	
Quiscale bronzé	QUBR	NMa Hr	NM H	●		●	
Vacher à tête brune	VATB	NMc Hr	NM H	●		●	
Oriole de Baltimore	ORBA	NMc hx	NM hx	●		●	
Roselin familier	ROFA	NMc Hp	NM H	●		●	
Chardonneret jaune	CHJA	NMa Hp	NM H	●		●	
Moineau domestique	MODO	NSc	NS	●		●	
Nombre d'espèces				53	10	32	2
Nombre total d'espèces				63		34	

1. Espèces classées par ordre taxonomique.

2. Statuts pour la Montérégie (ce qui inclut Montréal) et l'ensemble du Québec selon David (1996). Voir la légende des statuts.

3. Stations d'écoute: espèces décelées lors du dénombrement des stations d'écoute (IPA/DRL)

4. Hors-compte: espèces relevées lors des déplacements entre les stations seulement.

Légende des statuts définis par David (1996) utilisés

NM	<i>Nicheur migrateur</i>	i (suffixe)	<i>inusité</i>
NS	<i>Nicheur sédentaire</i>	x (suffixe)	<i>exceptionnel</i>
NR	<i>Nicheur résident</i>	r (suffixe)	<i>rare</i>
M	<i>Migrateur de passage</i>	p (suffixe)	<i>peu commun</i>
V	<i>Visiteur</i>	c (suffixe)	<i>commun</i>
E	<i>Estivant</i>	a (suffixe)	<i>abondant</i>
H	<i>Hivernage (hivernage réussi)</i>		
h	<i>Présences hivernales (pas d'hivernage)</i>		

Statut de nidification des espèces répertoriées, Falaise Saint-Jacques, 2007.

Espèce	Non nicheur		Nicheur		
	Migrateur	Observé	Possible	Probable	Confirmé
Bernache du Canada		X ¹			
Plongeon huard		X			
Cormoran à aigrettes		X			
Grand Héron		X			
Bihoreau gris		X			
Épervier de Cooper				P	
Buse à queue rousse	M				
Crécerelle d'Amérique	M				
Pluvier kildir			H		
Goéland à bec cerclé		X			
Pigeon biset		X			
Tourterelle triste			H		
Martinet ramoneur		X			
Colibri à gorge rubis					NJ
Martin-pêcheur d'Amérique		X			
Pic mineur				T	
Pic chevelu			H		
Pic flamboyant			H		
Moucherolle des aulnes				T	
Moucherolle tchébec	M				
Moucherolle phébi	M				
Viréo à tête bleue	M				
Viréo mélodieux			H		
Viréo aux yeux rouges					AT
Geai bleu			H		
Corneille d'Amérique					NO
Hirondelle bicolore	M				
Hirondelle rustique	M				
Mésange à tête noire					JE
Sittelle à poitrine rousse		X			
Sittelle à poitrine blanche			H		
Grimpereau brun	M				
Troglodyte familier			H		
Roitelet à couronne dorée	M				

Statut de nidification des espèces répertoriées, Falaise Saint-Jacques, 2007.

Espèce	Non nicheur		Nicheur		
	Migrateur	Observé	Possible	Probable	Confirmé
Roitelet à couronne rubis	M				
Grive fauve			H		
Grive solitaire	M				
Grive des bois	M				
Merle d'Amérique					AT-CN-JE
Moqueur chat					AT
Étourneau sansonnet					JE
Jaseur d'Amérique				T	
Paruline obscure	M				
Paruline à joues grises	M				
Paruline jaune					AT-NJ-JE
Paruline à flancs marron	M				
Paruline noir et blanc	M				
Paruline flamboyante				T	
Paruline couronnée	M				
Paruline triste	M				
Paruline masquée			H		
Tangara écarlate	M				
Bruant hudsonien	M				
Bruant familier	M				
Bruant chanteur					AT-JE
Bruant à gorge blanche	M				
Junco ardoisé	M				
Cardinal rouge					JE
Passerin indigo				P	
Carouge à épaulettes				T	
Quiscale bronzé				A	
Vacher à tête brune					NJ
Oriole de Baltimore			H		
Roselin familier			H		
Chardonneret jaune				T	
Moineau domestique			H		
Total (66 espèces)	23	10	13	9	11

INDICES DE NIDIFICATION

Espèce observée:

- M: espèce en migration
 X: observation de l'espèce pendant sa période de nidification.

Espèce nicheuse **possible**:

- H: présence de l'espèce dans son habitat durant sa période de nidification.

Espèce nicheuse **probable**:

- P: couple présent dans son habitat durant sa période de nidification.
 T: comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.).
 C: comportement nuptial (parade, copulation, échange de nourriture entre adultes).
 V: visite d'un site de nidification probable. Bien distinguer d'un site de repos.
 A: cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours.
 N: transport de matériel ou construction d'un nid par des troglodytes; forage d'une cavité par des pics.

Espèce nicheuse **confirmée**:

- CN: construction d'un nid ou transport de matériel (exception faite des troglodytes et des pics).
 NU: nid vide ayant été utilisé, ou coquilles d'oeuf de la présente saison. À'utiliser que lorsque l'identification est absolument sûre.
 AT: adulte transportant de la nourriture (pour les jeunes) durant sa période de nidification.
 PH: preuve physiologique (i.e. plaque incubatrice très vascularisée ou oeuf présent dans l'oviducte) observée sur un oiseau en main.
 DD: oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, ...
 NO: adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité).
 FE: adulte transportant un sac fécal.
 JE: jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances.
 NJ: nid contenant des oeufs ou des jeunes (vus ou entendus).
 Note: un oeuf ou un jeune Vacher à tête brune dans le nid d'une autre espèce constitue une preuve de nidification pour les deux espèces.